

## 【胃がん】

レジメン名	プロトコール				
<b>TS-1/TXL療法</b>  (S-1/PTX) 【1クール】21日 ・S-1:14日連日 ・パクリタキセル:Day1、Day8に投与 ・上記終了後1週間休薬	□ 1 : ヘパリンNaロック100シリンジ □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : ファモチジン(20mg/A) □ 4 : ネオレスター(10mg/A) □ 5 : パクリタキセル(50mg/m <sup>2</sup> ) □ 6 : 生食 □ 7 : ヘパリンNaロック100シリンジ S-1(40mg/m <sup>2</sup> ) □ 8 : 1日2回	5mL 4A 1A 1A mg 50mL 5mL	グラニセトロン点滴静注3mg/バック 生食 生食	1P 20mL 100mL	— 30分DIV iv iv 2時間DIV 必要時 — day1(夕)～day15(朝)まで
<b>ラムシルマブ/Nab-パクリタキセル療法</b>  (ラムシルマブ/Nab-パクリタキセル) 【1クール】28日 ・ラムシルマブ:Day1、Day15に投与 ・Nab-パクリタキセル:Day1、Day8、Day15に投与 ・上記終了後1週間休薬	□ 1 : 生食シリンジ □ 2 : ネオレスター(10mg/A) □ 3 : デカドロン(1.65mg/A) □ 4 : サイラムザ(8mg/kg) □ 5 : Nab-パクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> ) □ 6 : 生食シリンジ	10mL 1A 6A mg mg 10mL	生食 生食 生食	50mL 250mL 50mL	— iv 30分DIV 1時間DIV 30分DIV —
<b>SOX/トラスツズマブ療法</b>  (S-1/L-OHP/トラスツズマブ) 【1クール】21日 ・S-1:14日連日 ・L-OHP:Day1に投与 ・トラスツズマブ:Day1に投与 ・上記TS-1終了後1週間休薬	□ 1 : 生食 □ 2 : トラスツズマブ (初回6mg/kg、2回目以降) □ 3 : 生食シリンジ □ 4 : パロノセトロン点滴静注0.75mg/バック □ 5 : オキサリプラチン(130mg/m <sup>2</sup> ) □ 6 : 5%ブドウ糖 □ 7 : S-1(40mg/m <sup>2</sup> ) □ 8 : 1日2回	250mL mg 10mL 1袋 mg 100mL	生食 生食 デカドロン(1.65mg/A) 5%ブドウ糖	250mL 250mL 4A 250mL	— 90分DIV 30分DIV — 30分DIV 2時間DIV — day1(夕)～day15(朝)まで
<b>CaPeOX療法</b>  (カペシタビン/L-OHP) 【1クール】21日 ・L-OHP:Day1に投与 カペシタビン14日投与 ・上記終了後1週間休薬	□ 1 : 生食シリンジ □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : オキサリプラチン(130mg/m <sup>2</sup> ) □ 4 : 5%ブドウ糖 □ 5 : カペシタビン(1000mg/m <sup>2</sup> ) □ 6 : 1日2回	10mL 6A mg 10mL	グラニセトロン点滴静注3mg/バック「HK」 5%ブドウ糖	1P 250mL	— 30分DIV 2時間DIV iv day1(夕)～day15(朝)まで
<b>SOX療法</b>  (S-1/L-OHP) 【1クール】21日 ・L-OHP:Day1に投与 ・S-1:14日投与 ・上記終了後1週間休薬	□ 1 : 生食シリンジ □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : オキサリプラチン(100mg/m <sup>2</sup> ) □ 4 : 5%ブドウ糖 □ 5 : S-1(40mg/m <sup>2</sup> ) □ 6 : 1日2回	10mL 6A mg 10mL	グラニセトロン点滴静注3mg/バック「HK」 5%ブドウ糖	1P 250mL	— 30分DIV 2時間DIV iv day1(夕)～day15(朝)まで

レジメン名	プロトコール						
<b>TXL/CDDP療法</b> (PTX/CDDP) 【1クール】28日 ・PTX:Day1、Day8、Day15に投与 ・CDDP:Day1、Day8、Day15に投与 ・上記終了後1週間休薬	☆ 前日ソルデム3A 2000mLの負荷 <input type="checkbox"/> 1 : アクメイン 2500mL <input type="checkbox"/> 2 : デカドロン(1.65mg/A) 10A <input type="checkbox"/> 3 : ネオレスター(10mg/A) 1A <input type="checkbox"/> 4 : ファモチジン(20mg/A) 20mg <input type="checkbox"/> 5 : パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) mg <input type="checkbox"/> 6 : グラニセトロン点滴静注3mg/バック「HK」 1P <input type="checkbox"/> 7 : シスプラチニ(25mg/m <sup>2</sup> ) mg <input type="checkbox"/> 8 : ラシックス(20mg/A) 10mg ☆ 翌日ソルデム3A 1000mLの負荷	生食	50mL	— 100mL/hr で朝より 30分DIV iv			
		生食	20mL	iv			
		生食	100mL	1時間DIV 30分DIV			
		生食	200mL	2時間DIV iv			
		—	—	—			
<b>TS-1/CDDP療法</b> (S-1/CDDP) 【1クール】35日 ・TS-1:21日連日 ・CDDP:Day8に投与 ・上記終了後2週間休薬	☆ 前日ソリタT3号 2000mLの負荷 <input type="checkbox"/> 1 : ヘパリンNaロック100シリンジ <input type="checkbox"/> 2 : ラクテック 1000mL <input type="checkbox"/> 3 : デカドロン(1.65mg/A) 4A <input type="checkbox"/> 4 : ラシックス(20mg/A) 20mg <input type="checkbox"/> 5 : シスプラチニ(60mg/m <sup>2</sup> ) mg <input type="checkbox"/> 6 : ラクテック 1000mL <input type="checkbox"/> 7 : ソルデム3A 500mL <input type="checkbox"/> 8 : ヘパリンNaロック100シリンジ 5mL <input type="checkbox"/> 9 : S-1(40mg/m <sup>2</sup> ) 1日2回	グラニセトロン点滴静注3mg/バック 生食	1P	— 250mL/hr 30分DIV iv			
		生食	1000mL	2時間DIV 250mL/hr 80mL/hr翌日昼まで			
		—	—	—			
		—	day1(夕)～day22(朝)まで	—			
<b>TCF療法</b> (PTX/CDDP/5-FU) 【1クール】28日 ・PTX:Day1、Day8、Day15に投与 ・CDDP:Day1、Day8、Day15に投与 ・5-FU:Day1、Day8、Day15に投与 ・上記終了後1週間休薬	☆ 前日ソルデム3A 2000mLの負荷 <input type="checkbox"/> 1 : ソルデム2 1000mL <input type="checkbox"/> 2 : デカドロン(1.65mg/A) 10A <input type="checkbox"/> 3 : ファモチジン(20mg/A) 20mg <input type="checkbox"/> 4 : ネオレスター(10mg/A) 1A <input type="checkbox"/> 5 : パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) mg <input type="checkbox"/> 6 : グラニセトロン点滴静注3mg/バック 1P <input type="checkbox"/> 7 : シスプラチニ(25mg/m <sup>2</sup> ) mg <input type="checkbox"/> 8 : ラシックス(20mg/A) 10mg <input type="checkbox"/> 9 : フルオロウラシル(600mg/m <sup>2</sup> ) mg ☆ 翌日ソルデム3A 1000mLの負荷	生食	50mL	— 100mL/hr で朝より 30分DIV iv			
		生食	20mL	iv			
		生食	100mL	1時間DIV 30分DIV			
		生食	200mL	2時間DIV iv			
		生食	200mL	翌朝まで			
		—	—	—			
<b>TS-1/CPT-11療法</b> (S-1/CPT-11) 【1クール】35日 ・S-1:21日連日 ・CPT-11:Day1、Day15に投与 ・上記TS-1終了後2週間休薬	□ 1 : ヘパリンNaロック100シリンジ <input type="checkbox"/> 2 : デカドロン(1.65mg/A) 4A <input type="checkbox"/> 3 : イリノテカン塩酸塩(80mg/m <sup>2</sup> ) mg <input type="checkbox"/> 4 : 生食 10mL <input type="checkbox"/> 5 : ヘパリンNaロック100シリンジ 5mL <input type="checkbox"/> 6 : S-1(40mg/m <sup>2</sup> ) 1日2回	グラニセトロン点滴静注3mg/バック 生食	1P	— 30分DIV 2時間DIV フラッシュ —			
		生食	100mL	day1(夕)～day22(朝)まで			

レジメン名	プロトコール				
<b>5-FU持続療法(3日間)</b> (5-FU) 【1クール】7日(週3回) ・5-FU:Day1～3に投与	<input type="checkbox"/> 1 : ヘパリンNaロック100シリンジ <input type="checkbox"/> 2 : フルオロウラシル( mg/m <sup>2</sup> )	mg	生食 ヘパリン	mL mL	— 72時間用シェアヒューヤーにて
<b>TS-1/DOC療法</b> (S-1/DTX) 【1クール】28日 ・S-1:21日連日 ・DTX:Day1、Day15に投与 ・上記終了後1週間休薬	<input type="checkbox"/> 1 : ヘパリンNaロック100シリンジ <input type="checkbox"/> 2 : デカドロン(1.65mg/A) <input type="checkbox"/> 3 : ファモチジン(20mg/A) <input type="checkbox"/> 4 : ネオレスター(10mg/A) <input type="checkbox"/> 5 : ドセタキセル(30mg/m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 6 : 生食 <input type="checkbox"/> 7 : ヘパリンNaロック100シリンジ S-1(40mg/m <sup>2</sup> ) 1日2回	4A 20mg 1A mg 50mL 5mL	グラニセトロン点滴静注3mg/バック 生食	1P 20mL 100mL	— 30分DIV iv iv 2時間DIV ブッシュ用 — day1(夕)～day22(朝)まで
<b>low dose FP療法</b> (5-FU/CDDP) 【1クール】7日(週3日) ・5-FU/CDDP:Day1～3に投与 ・上記終了後1週間休薬	A Day1,2,3 <input type="checkbox"/> 1 : フルオロウラシル(250～750mg/day) シスプラチン(7～10mg/day)	mg mg	生食	500mL	20mL/hrでDIV
<b>low dose FP/CPT-11交替療法</b> (5-FU/CDDP/CPT-11) 【1クール】7日(週3日) ・5-FU/CDDP:週3回投与 ・CPT-11:週3回投与 ・上記5-FU/CDDP、CPT-11を交替で	A Day1,2,3 <input type="checkbox"/> 1 : ヘパリンNaロック100シリンジ <input type="checkbox"/> 2 : グラニセトロン点滴静注3mg/バック <input type="checkbox"/> 3 : フルオロウラシル(250～750mg/day) シスプラチン(7～10mg/day)	5mL 1P mg mg	ヘパリン	4mL	— 30分DIV 48時間用シェアヒューヤーにて、
<b>low dose FP/CPT-11交替療法</b> (5-FU/CDDP/CPT-11) 【1クール】7日(週3日) ・5-FU/CDDP:週3回投与 ・CPT-11:週3回投与 ・上記5-FU/CDDP、CPT-11を交替で	B Day8,9,10 <input type="checkbox"/> 1 : ヘパリンNaロック100シリンジ <input type="checkbox"/> 2 : グラニセトロン点滴静注3mg/バック <input type="checkbox"/> 3 : 生食 <input type="checkbox"/> 4 : イリノテカンド酸塩(30～50mg/m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 5 : 生食 <input type="checkbox"/> 6 : ヘパリンNaロック100シリンジ	1P 10mL mg 10mL 5mL	生食	100mL	— 30分DIV iv 2時間DIV iv —
<b>weeklyパクリタキセル療法</b> (PTX) 【1クール】7日 ・PTX:Day1に投与 ・上記を週1回毎に投与	<input type="checkbox"/> 生食 <input type="checkbox"/> 1 : ネオレスター(10mg/A) <input type="checkbox"/> 2 : ファモチジン(20mg/A) <input type="checkbox"/> 3 : デカドロン(1.65mg/A) <input type="checkbox"/> 4 : グラニセトロン点滴静注3mg/バック「HK」 (初回のみ10A) <input type="checkbox"/> 5 : パクリタキセル(80～100mg/m <sup>2</sup> )	50mL 1A 20mg 5A 1P mg	生食 生食50mLの残りin bottle	20mL 5%ブドウ糖 250mL	末梢keep iv iv 5分DIV 30分DIV 3時間DIV

レジメン名	プロトコール				
<b>ラムシルマブ/パクリタキセル療法</b> (ラムシルマブ/パクリタキセル) 【1クール】28日 ・ラムシルマブ:Day1、Day15に投与 ・パクリタキセル:Day1、Day8、Day15に投与 ・上記終了後1週間休薬	<input type="checkbox"/> 1 : ヘパリンNaロック100シリソジ <input type="checkbox"/> 2 : ネオレスター(10mg/A) <input type="checkbox"/> 3 : フアモチジン(20mg/A) <input type="checkbox"/> 4 : デカドロン(1.65mg/A) <input type="checkbox"/> 5 : サイラムザ(8mg/kg) <input type="checkbox"/> 6 : パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 7 : ヘパリンNaロック100シリソジ	5mL 1A 20mg 4A mg mg 5mL	生食 生食 5%ブドウ糖	50mL 250mL 250mL	— iv iv 15分DIV 1時間DIV 1時間DIV —
<b>ラムシルマブ単剤療法</b> (ラムシルマブ) 【1クール】28日 ・ラムシルマブ:Day1に投与 ・上記を2週間毎に投与	<input type="checkbox"/> 1 : ヘパリンNaロック100シリソジ <input type="checkbox"/> 2 : 生食 <input type="checkbox"/> 3 : ネオレスター(10mg/A) <input type="checkbox"/> 4 : サイラムザ(8mg/kg) <input type="checkbox"/> 5 : 生食 <input type="checkbox"/> 6 : ヘパリンNaロック100シリソジ	5mL 100mL 1A mg 20mL 5mL	生食	250mL	— keep用 iv 1時間DIV プッシュ用 —