

【肺がん-non small-】

レジメン名	プロトコール					
3-4w DOC療法 (DOC) 【1クール】21～28日 ・DOC:Day1に投与 ・stageIV ・アルコール過敏の確認！！ ・上記終了後2～3週間休薬	A Day1 □ 1 : ソルデム3A □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : ネオレスター(10mg/A) ☆ ECG、モニター開始。Dr,call Line確認 □ 4 : ドセタキセル(60～70mg/m ²) □ 5 : プッシュ用生食	500mL 8A 1A mg 50mL	グラニセトロン点滴静注3mg/バック 5%ブドウ糖	1P 250mL	80mL/hr - iv 2時間DIV -	
パクリタキセル+カルボプラチナ療法 (PTX/CBDCA) 【1クール】21日 ・TXL:Day1に投与 ・CBDCA:Day1に投与 ・上記終了後2週間休薬	A Day1 □ 1 : ソルデム3A □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : グラニセトロン点滴静注3mg/バック □ 4 : フェアモチジン(20mg/A) ★ レスタミン(10) 5錠内服(同時に) □ 5 : パクリタキセル(200mg/m ²) □ 6 : カルボプラチナ(AUC6) □ 7 : ヘパリンNaロック100シリンジ	500mL 10A 1P 20mg mg mg 5mL	生食 生食 生食 生食 生食	50mL 50mL 500mL 250mL	20mL/hr keep - 30分DIV 30分DIV 3時間DIV 1時間DIV -	
ドセタキセル療法 (DOC) 【1クール】21～28日 ・DOC:Day1に投与 ・アルコール過敏の確認！！ ・上記終了後1週間休薬	A Day1 □ 1 : ソルデム3A □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : ドセタキセル(60mg/m ²) □ 4 : プッシュ用生食	500mL 4A mg 50mL	グラニセトロン点滴静注3mg/バック 生食	1P 500mL	20mL/hr 30分DIV 2時間DIV	

レジメン名	プロトコール					
C B D C A + P E M + B V 療法 (CBDCA)/PEM/BV) 【1クール】21日 ・PEM:Day1に投与 ・CBDCA:Day1に投与 ・BeV[:Day1に投与 ・上記終了後2週間休薬	A Day1 □ 1 : デカドロン(1.65mg/A) □ 2 : アロキシ点滴静注バッグ0.75mg □ 3 : ペメトレキセド(500mg/m ²) □ 4 : カルボプラチナ(AUC6) □ 5 : 生食 葉酸 □ 6 : 1日1回 □ 7 フレスミン(1000mg/A)	4A 1袋 mg mg mg 20mL 0.5mg 1A	生食 生食 生食 生食	50mL 100mL 250mL 100mL iv ペメトレキセド投与7日前からペメトレキセド投与後22日目まで 9週ごとに投与	10分DIV 10分DIV 1時間DIV 1時間DIV(初回は90分) iv	
カルボプラチナ+イリノテカン療法 (CBDCA/CPT-11) 【1クール】21日 ・CBDCA:Day1に投与 ・CPT-11:Day1・8・15に投与 ・上記終了後1週間休薬	A Day1 □ 1 : アロキシ点滴静注バッグ0.75mg □ 2 : カルボプラチナ(AUC4~5) □ 3 : イリノテカン塩酸塩(60mg/m ²) □ 4 : 生食 A Day8・15 □ 1 : アロキシ点滴静注バッグ0.75mg □ 2 : イリノテカン塩酸塩(60mg/m ²) □ 3 : 生食	1袋 mg mg 20mL 1袋 mg 20mL	生食 生食 生食 生食	500mL 250mL iv 30分DIV 90分DIV iv 250mL 90分DIV iv	1時間DIV 90分DIV iv	
ペメトレキセド単独療法 (DOC) 【1クール】21~28日 ・ペメトレキセドDay1に投与 ・アルコール過敏の確認!! ・上記終了後2~3週間休薬	A Day1 □ 1 : ソルデム3A □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : ネオレスター(10mg/A) □ 4 : ペメトレキセド(500mg/m ²) □ 5 : プッシュ用生食 葉酸 □ 6 フレスミン(1000mg/A)	500mL 4A 1A mg 50mL 0.5mg 1A	グラニセトロン点滴静注3mg/パック 生食	1P 100mL - - ペメトレキセド投与7日前からペメトレキセド投与後22日目まで 9週ごとに投与	80mL/hr 10分DIV iv	

【肺がん-small-】

レジメン名	プロトコール			
アムルビシン（カルセド）療法 (AMR) 【1クール】21～28日 •AMR:Day1～3に投与 •上記終了後2～3週間休薬	A Day1 <input type="checkbox"/> 1 生食(20mL/hr) 100mL <input type="checkbox"/> 2 : グラニセトロン点滴静注3mgバック 1P <input type="checkbox"/> 3 : カルセド(40mg/m ²) mg <input type="checkbox"/> 4 ヘパリンNaロック100シリンジ 5mL	5%ブドウ糖 20mL	20mL/hr keep 30分DIV 5分iv -	