

【尿路上皮がん】

レジメン名	プロトコール				
<p>M-VAC療法 (MTX/VBL/ADM/CDDP) 【1クール】28日 ・MTX:Day1、15、22に投与 ・VBL:Day2、15、22に投与 ・ADM:Day2に投与 ・CDDP:Day2に投与 ・上記を1クールとし通常2~3クール施行</p>	<p>A Day1 □ 1 : メイロン8.4% 20mL : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 : メソトレキセート(30mg/m²) mg □ 3 : メイロン8.4% 20mL □ 4 : ラシックス(20mg/A) 20mg □ 5 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 6 : ソルデム3A 500mL</p>	<p>ビカーボン 500mL 生食 100mL ソルデム3A 500mL 生食 100mL ビカーボン 500mL</p>	<p>6時間DIV 1時間DIV 6時間DIV 30分DIV 6時間DIV 6時間DIV</p>		
<p>M-VAC療法 (MTX/VBL/ADM/CDDP) 【1クール】28日 ・MTX:Day1、15、22に投与 ・VBL:Day2、15、22に投与 ・ADM:Day2に投与 ・CDDP:Day2に投与 ・上記を1クールとし通常2~3クール施行</p>	<p>B Day2 □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 : グラニセロン点滴静注3mgバック 1P □ 3 : デカドロン(1.65mg/A) 2A □ 4 : エクザール(3mg/m²) mg □ 5 : アドリアシン(30mg/m²) mg □ 6 : グラニセロン点滴静注3mgバック 1P □ 7 シスプラチン(70mg/m²) mg □ 8 : マンニトールS 300mL □ 9 : デカドロン(1.65mg/A) 2A □ 0 ラシックス(20mg/A) 20mg □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 : ソルデム3A 500mL</p>	<p>ビカーボン 500mL ソルデム3A 500mL 生食 100mL 生食 100mL 生食 500mL ソルデム3A 500mL 生食 50mL ビカーボン 500mL</p>	<p>4時間DIV 30分DIV 4時間DIV 1時間DIV 1時間DIV 30分DIV 3時間DIV 3時間DIV 5時間DIV 30分DIV 4時間DIV 4時間DIV</p>		
<p>M-VAC療法 (MTX/VBL/ADM/CDDP) 【1クール】28日 ・MTX:Day1、15、22に投与 ・VBL:Day2、15、22に投与 ・ADM:Day2に投与 ・CDDP:Day2に投与 ・上記を1クールとし通常2~3クール施行</p>	<p>C Day3 □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 : グラニセロン点滴静注3mgバック 1P □ 6 : ソルデム3A 500mL □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 : ソルデム3A 500mL</p>	<p>ビカーボン 500mL ビカーボン 500mL</p>	<p>6時間DIV 30分DIV 6時間DIV 6時間DIV 6時間DIV</p>		

レジメン名	プロトコール				
<p>M-VAC療法</p> <p>(MTX/VBL/ADM/CDDP)</p> <p>【1クール】28日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・MTX:Day1、15、22に投与 ・VBL:Day2、15、22に投与 ・ADM:Day2に投与 ・CDDP:Day2に投与 ・上記を1クールとし通常2~3クール施行 	<p>D Day4,5</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 ソルデム3A 500mL □ 3 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 4 : ソルデム3A 500mL 	<p>ビカーボン 500mL</p> <p>ビカーボン 500mL</p>	<p>6時間DIV</p> <p>6時間DIV</p> <p>6時間DIV</p> <p>6時間DIV</p>		
<p>M-VAC療法</p> <p>(MTX/VBL/ADM/CDDP)</p> <p>【1クール】28日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・MTX:Day1、15、22に投与 ・VBL:Day2、15、22に投与 ・ADM:Day2に投与 ・CDDP:Day2に投与 ・上記を1クールとし通常2~3クール施行 	<p>E Day1,15,22</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 メトトレキサート(30mg/m²) mL □ 3 : ソルデム3A 500mL □ 4 : エクザール(3mg/m²) mL □ 5 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 6 : ソルデム3A 500mL 	<p>ビカーボン 500mL</p> <p>生食 100mL</p> <p>生食 100mL</p> <p>ビカーボン 500mL</p>	<p>6時間DIV</p> <p>1時間DIV</p> <p>6時間DIV</p> <p>1時間DIV</p> <p>6時間DIV</p> <p>6時間DIV</p>		
<p>M-VAC療法 (Nedaplatin)</p> <p>(MTX/VBL/ADM/CDDP)</p> <p>【1クール】28日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・MTX:Day1、15、22に投与 ・VBL:Day2、15、22に投与 ・ADM:Day2に投与 ・NDP:Day2に投与 ・上記を1クールとし通常2~3クール施行 	<p>A Day1</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1 : メイロン8.4% 20mL □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 : メトトレキサート(30mg/m²) mg □ 3 : メイロン8.4% 20mL □ 4 : ラシックス(20mg/A) 20mg □ 5 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 6 ソルデム3A 500mL 	<p>ビカーボン 500mL</p> <p>生食 100mL</p> <p>ソルデム3A 500mL</p> <p>生食 100mL</p> <p>ビカーボン 500mL</p>	<p>6時間DIV</p> <p>1時間DIV</p> <p>6時間DIV</p> <p>30分DIV</p> <p>6時間DIV</p> <p>6時間DIV</p>		

レジメン名	プロトコール				
<p>M-VAC療法 (Nedaplatin) (MTX/VBL/ADM/CDDP) 【1クール】28日 ・MTX:Day1、15、22に投与 ・VBL:Day2、15、22に投与 ・ADM:Day2に投与 ・NDP:Day2に投与 ・上記を1クールとし通常2~3クール施行</p>	<p>B Day2</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 : グラニセロン点滴静注3mg/バック 1P □ 3 : デカドロン(1.65mg/A) 2A □ 4 : エクザール(3mg/m²) mg □ 5 : アドリアシン(30mg/m²) mg □ 6 : グラニセロン点滴静注3mg/バック 1P □ 7 アクブラ(70mg/m²) mg □ 8 : マンニトールS 300mL □ 9 : デカドロン(1.65mg/A) 2A □ 0 ラシックス(20mg/A) 20mg □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 : ソルデム3A 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> ビカーボン 500mL ソルデム3A 500mL 生食 100mL 生食 100mL 生食 500mL ソルデム3A 500mL 生食 50mL ビカーボン 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> 4時間DIV 30分DIV 4時間DIV 1時間DIV 1時間DIV 30分DIV 3時間DIV 3時間DIV 5時間DIV 30分DIV 4時間DIV 4時間DIV 		
<p>M-VAC療法 (Nedaplatin) (MTX/VBL/ADM/CDDP) 【1クール】28日 ・MTX:Day1、15、22に投与 ・VBL:Day2、15、22に投与 ・ADM:Day2に投与 ・NDP:Day2に投与 ・上記を1クールとし通常2~3クール施行</p>	<p>C Day3</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 : グラニセロン点滴静注3mg/バック 1P □ 6 ソルデム3A 500mL □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 : ソルデム3A 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> ビカーボン 500mL ビカーボン 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> 6時間DIV 30分DIV 6時間DIV 6時間DIV 6時間DIV 		
<p>M-VAC療法 (Nedaplatin) (MTX/VBL/ADM/CDDP) 【1クール】28日 ・MTX:Day1、15、22に投与 ・VBL:Day2、15、22に投与 ・ADM:Day2に投与 ・NDP:Day2に投与 ・上記を1クールとし通常2~3クール施行</p>	<p>D Day4,5</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 2 ソルデム3A 500mL □ 3 : プリンペラン(10mg/A) 1A □ 4 : ソルデム3A 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> ビカーボン 500mL ビカーボン 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> 6時間DIV 6時間DIV 6時間DIV 6時間DIV 		

レジメン名	プロトコール				
<p>M-VAC療法 (Nedaplatin) (MTX/VBL/ADM/CDDP) 【1クール】28日 ・MTX:Day1、15、22に投与 ・VBL:Day2、15、22に投与 ・ADM:Day2に投与 ・NDP:Day2に投与 ・上記を1クールとし通常2~3クール施行</p>	<p>E Day15,22 □ 1 : プリンペラン(10mg/A) □ 2 : メトトレキサート(30mg/m²) □ 3 : ソルデム3A □ 4 : エクザール(3mg/m²) □ 5 : プリンペラン(10mg/A) □ 6 : ソルデム3A</p>	<p>1A mL 500mL mL 1A 500mL</p>	<p>ビカーボン 生食 生食 生食 ビカーボン</p>	<p>500mL 100mL 100mL 500mL</p> <p>6時間DIV 1時間DIV 6時間DIV 1時間DIV 6時間DIV 6時間DIV</p>	
<p>GT療法 (GEM/TXL) 【1クール】28日 ・GEM:Day1、8、15に投与 ・TXL:Day1に投与 ・上記終了後1週間休薬</p>	<p>A □ 1 : ビカーボン □ 2 : ファモチジン(20mg/A) デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : ネオレスタール(10mg/A) □ 4 : グラニセトロン点滴静注3mgバック □ 5 : パクリタキセル(200mg/m²) □ 6 : ゲムシタビン(1000mg/m²) □ 7 : ビカーボン</p>	<p>500mL 20mg 12A 10mg 1P mg mg 500mL</p>	<p>生食 生食 生食 生食</p>	<p>50mL 500mL 100mL</p> <p>10時間DIV 30分DIV iv 30分DIV 3時間DIV 30分DIV 10時間DIV</p>	
<p>GT療法 (GEM/TXL) 【1クール】28日(4週) ・GEM:Day1、8、15に投与 ・TXL:Day1に投与 ・上記終了後1週間休薬</p>	<p>B □ 1 : ラクテック □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : グラニセトロン点滴静注3mgバック □ 4 : ゲムシタビン(1000mg/m²) □ 5 : ラクテック □ :</p>	<p>500mL 4A 1P mg 500mL</p>	<p>生食 生食</p>	<p>50mL 100mL</p> <p>10時間DIV 30分DIV 30分DIV 30分DIV 10時間DIV</p>	
<p>GC療法 (GEM/CDDP) 【1クール】28日(4週) (ただしDay15中止7日休薬=1クール21日あり) ・GEM:Day1、8、15に投与 ・CDDP:Day2に投与 ・上記終了後1週間休薬</p>	<p>A □ 1 : 生食 □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : ゲムシタビン(1000mg/m²)</p>	<p>250mg 4A mg</p>	<p>生食 生食 生食</p>	<p>50mL 100mL</p> <p>keep用 30分DIV 30分DIV</p>	

レジメン名	プロトコール				
<p>GC療法 (GEM/CDDP) 【1クール】28日(4週) (ただしDay15中止7日休薬=1クール21日あり) ・GEM:Day1、8、15に投与 ・CDDP:Day2に投与 ・上記終了後1週間休薬</p>	<p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 20mg □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) 2A □ 3 グラニセロン点滴静注3mgバック 1P □ 4 シスプラチン(70mg/m²) mg □ 5 : マンニトールS 300mL □ 6 : ラシックス(20mg/A) 20mg □ 7 : デカドロン(1.65mg/A) 2A □ 8 プリンペラン(10mg/A) 20mg □ 9 ソルデム3A 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> ラクテック 500mL ソルデム3A 500mL 生食 500mL ラクテック 500mL ソルデム3A 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> 4時間DIV 4時間DIV 30分DIV 3時間DIV 100mL/hr IV 5時間DIV 4時間DIV 4時間DIV 		
<p>GN療法 (GEM/NDP) 【1クール】28日(4週) (ただしDay15中止7日休薬=1クール21日あり) ・GEM:Day1、8、15に投与 ・NDP:Day1に投与 ・上記終了後1週間休薬</p>	<p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1 : 生食 250mg □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) 4A □ 3 ゲムシタシン(1000mg/m²) mg 	<ul style="list-style-type: none"> 生食 50mL 生食 100mL 	<ul style="list-style-type: none"> keep用 30分DIV 30分DIV 		
<p>GN療法 (GEM/NDP) 【1クール】28日(4週) (ただしDay15中止7日休薬=1クール21日あり) ・GEM:Day1、8、15に投与 ・NDP:Day1に投与 ・上記終了後1週間休薬</p>	<p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 20mg □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) 2A □ 3 グラニセロン点滴静注3mgバック 1P □ 4 アクブラ(70mg/m²) mg □ 5 : マンニトールS 300mL □ 6 : ラシックス(20mg/A) 20mg □ 7 : デカドロン(1.65mg/A) 2A □ 8 プリンペラン(10mg/A) 20mg □ 9 ソルデム3A 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> ラクテック 500mL ソルデム3A 500mL 生食 500mL ラクテック 500mL ソルデム3A 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> 4時間DIV 4時間DIV 30分DIV 3時間DIV 100mL/hr IV 5時間DIV 4時間DIV 4時間DIV 		

レジメン名	プロトコール				
<p>HD-GN療法</p> <p>(GEM/NDP)</p> <p>【1クール】28日(4週)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・GEM:Day1、8、15(非透析日)に投与 ・NDP:Day2(透析日)に投与 ・遠隔転移、慢性腎不全 ・大量輸液なし ・上記終了後1週間休薬 	<p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 10mg □ 2 : ゲムシタビン(650mg/m²) mg □ 3 □ 4 □ 5 : □ 6 : 	<ul style="list-style-type: none"> ソルデム6 500mL 生食 100mL 	<ul style="list-style-type: none"> 12時間DIV 30分DIV 		
<p>HD-GN療法</p> <p>(GEM/NDP)</p> <p>【1クール】28日(4週)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・GEM:Day1、8、15(非透析日)に投与 ・NDP:Day2(透析日)に投与 ・遠隔転移、慢性腎不全 ・大量輸液なし ・上記終了後1週間休薬 	<p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 10mg □ 2 : グラニセトロン注1mgシリンジ 1本 □ 3 アクブラ mg □ 4 □ 5 : □ 6 : □ 7 : □ 8 □ 9 	<ul style="list-style-type: none"> ソルデム6 500ml 生食 100ml 			
<p>M-N動注療法</p> <p>(MTX/NDP)</p> <p>【1クール】42日(6週)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・MTX:Day1、15、29に投与 ・NDP:Day1、15、29に投与 ・動注ポートより投与 ・上記終了後1週間休薬 	<ul style="list-style-type: none"> □ 1 : プリンペラン(10mg/A) 10mg □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) 6A □ 3 : パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 1P □ 4 : ビカーボン 500mL □ 5 : メソトレキセート(30mg/m²) mg □ 6 : アクブラ(45mg/m²) mg □ 7 : プリンペラン(10mg/A) 10mg □ 8 ビカーボン 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> ビカーボン 500mL 生食 50mL 生食 50mL 生食 50mL 生食 20mL ビカーボン 500mL 	<ul style="list-style-type: none"> 6時間DIV 30分DIV 6時間DIV 1時間DIV 1時間DIV 6時間DIV 6時間DIV 		

レジメン名	プロトコール				
<p>M-C動注療法 (動注化学放射線同時併用療法)</p> <p>(MTX/CDDP)</p> <p>【1クール】42日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・MTX:Day1、15、29に投与 ・CDDP:Day1、15、29に投与 ・放射線を併用しない場合もあり ・左記投与を2週毎に繰り返し3コースで終了 	<ul style="list-style-type: none"> □ 1 : プリンペラン(10mg/A) □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg □ 4 : ビカーボン □ 5 : メソトレキセート(30mg/m²) □ 6 : シスプラチン(45mg/m²) □ 7 プリンペラン(10mg/A) □ 8 ビカーボン 	<p>10mg</p> <p>6A</p> <p>1P</p> <p>500mL</p> <p>mg</p> <p>mg</p> <p>10mg</p> <p>500mL</p>	<p>ビカーボン</p> <p>生食</p> <p>生食</p> <p>生食</p> <p>生食</p> <p>ビカーボン</p> <p>ビカーボン</p>	<p>500mL</p> <p>500mL</p> <p>50mL</p> <p>500mL</p> <p>50mL</p> <p>50mL</p> <p>500mL</p> <p>500mL</p>	<p>6時間DIV</p> <p>6時間DIV</p> <p>30分DIV</p> <p>6時間DIV</p> <p>1時間DIV</p> <p>30分DIV</p> <p>6時間DIV</p> <p>6時間DIV</p>
<p>low dose cisplatin+UFT療法</p> <p>(CDDP)</p> <p>【1コース】7日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・CDDP:週1~3回投与 ・UFT用量適宜 	<ul style="list-style-type: none"> □ 1 : ソルデム3A □ 2 : グラニセトロン点滴静注3mgバッグ □ 3 : シスプラチン(5mg/body) □ 4 : ソルデム3A 	<p>500ml</p> <p>1P</p> <p>mg</p> <p>500ml</p>	<p>生食</p> <p>生食</p>	<p>100mL</p>	<p>12時間DIV</p> <p>1時間DIV</p> <p>1時間DIV</p> <p>12時間DIV</p>