

【前立腺がん】

レジメン名	プロトコール					
DP併用療法 (DOC) 【1ケール】28日(4週) ・DOC:Day1に投与 ・内服プレドニン10mg:朝夕連日服用 ・アルコール過敏の確認!! ・上記DOCを28日毎	★ 朝夕 連日 プレドニン10mg投与!! <input type="checkbox"/> 1:生食 250mL <input type="checkbox"/> 2:ファモチジン(20mg/A) 20mg <input type="checkbox"/> 3:デカドロン(1.65mg/A) 5A <input type="checkbox"/> 4:ドセタキセル(60mg/m ²) mg : : :	グラニセトロン点滴静注3mg/バック 生食	1P	250mL	20ml/hr iv 30分DIV 2時間DIV	
カバジタキセル・プレドニゾロン療法 (cabazitaxel) 【1ケール】21日(3週) ・cabazitaxel:Day1に投与 ・内服プレドニン10mg:朝夕連日服用 ・アルコール過敏の確認!! ・専用ルートで投与 ・上記cabazitaxelを28日毎	★ 朝夕 連日 プレドニン10mg投与!! <input type="checkbox"/> 1:ラクテック 500ml <input type="checkbox"/> 2:ネオレスター(10mg/A) 5mg <input type="checkbox"/> 3:ファモチジン(20mg/A) 20mg <input type="checkbox"/> 4:デカドロン(1.65mg/A) 5A <input type="checkbox"/> 5:ジェブタナ(25mg/m ²) mg	グラニセトロン点滴静注3mg/バック 5%ブドウ糖	1P	mL	24時間DIV iv iv 30分DIV 1時間DIV	