

## 【精巣腫瘍】

レジメン名	プロトコール				
<b>BEP療法</b> (BLM/ETP/CDDP) 【1クール】21日 ・BLM:Day1、8、15に投与 ・ETP:Day1、2、3、4、5に投与 ・CDDP:Day1、2、3、4、5に投与 ・上記を通常3~4クール	A Day1				
	□ 1 メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	5時間DIV
	□ 2 : デカドロン(1.65mg/A)	2A	グラニセトロン点滴静注3mg/バック	1P	30分DIV
	□ 3 : シスプラチニン(20mg/m <sup>2</sup> )	mg	生食	500mL	5時間DIV
	□ 4 : マンニットールS	300mL			シスプラチニンと同時に60mL/hr
	□ 5 : メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	5時間DIV
	□ 6 : エトポシド(100mg/m <sup>2</sup> )	mg	生食	500mL	3時間DIV
	□ 7 : メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	5時間DIV
	□ 8 : ブレオ(30mg/body)	mg	生食	100mL	2時間DIV
	□ 9 : グラニセトロン点滴静注3mg/バック	1P			30分DIV
<b>BEP療法</b> (BLM/ETP/CDDP) 【1クール】21日 ・CPA:Day1に投与 ・ADM:Day1に投与 ・VCR:Day1に投与 ・上記を通常3~4クール	B Day2,3,4,5				
	□ 1 メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	5時間DIV
	□ 2 : デカドロン(1.65mg/A)	2A	グラニセトロン点滴静注3mg/バック	1P	30分DIV
	□ 3 : シスプラチニン(20mg/m <sup>2</sup> )	mg	生食	500mL	5時間DIV
	□ 4 : マンニットールS	300mL			シスプラチニンと同時に60mL/hr
	□ 5 : メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	5時間DIV
	□ 6 : エトポシド(100mg/m <sup>2</sup> )	mg	生食	500mL	3時間DIV
	□ 7 : メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	5時間DIV
	□ 8 : グラニセトロン点滴静注3mg/バック	1P			30分DIV
	□ 9 メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	5時間DIV
<b>BEP療法</b> (BLM/ETP/CDDP) 【1クール】21日 ・BLM:Day1、8、15に投与 ・ETP:Day1、2、3、4、5に投与 ・CDDP:Day1、2、3、4、5に投与 ・上記を通常3~4クール	C Day8,15				
	□ 1 : メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	5時間DIV
	□ 2 : グラニセトロン点滴静注3mg/バック	1P			30分DIV
	□ 3 : ブレオ(30mg/body)	mg	生食	100mL	2時間DIV
	□ 4 メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	5時間DIV
	□ 5 メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	5時間DIV
	□ 6 メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	5時間DIV
	□ 7 メイロン8.4%(20mL/A)	10mL	ラクテック	500mL	4時間DIV