

【平滑筋肉腫】

レジメン名	プロトコール					
CYVADIC療法 (CPA/VCR/ADM/DTIC/) 【1クール】28日 ・CPA:Day1に投与 ・VCR:Day1に投与 ・ADM:Day1に投与 ・DTIC:Day1～5に投与 ・プレドニゾロンをDay1～5に内服 ・上記終了後3週間休薬	A Day1 □ 1 : グラニセトロン点滴静注3mg/バック □ 2 : オンコビン(1.5mg/m ²)上限2mg/m ² □ 3 : アドリアシン(50mg/m ²) □ 4 : エンドキサン(500mg/m ²) □ 5 : ダカルバジン(250mg/m ²) □ 6 : メイロン8.4% : プリンペラン(10mg/A) □ 7 : メイロン8.4% : プリンペラン(10mg/A) ★ Day1～5に、プレドニゾロン 60mg/body を内服	1P mg mg mg 20mL 1A 20mL 1A	生食 生食 生食 生食 ビカーボン ビカーボン	20mL 100mL 500mL 500mL 500mL 500mL	iv 30分DIV 30分DIV 2時間DIV 2時間DIV 2.5時間DIV 2.5時間DIV	
CYVADIC療法 (CPA/VCR/ADM/DTIC/) 【1クール】28日 ・MTX:Day1、15、22に投与 ・VBL:Day2、15、22に投与 ・ADM:Day2に投与 ・CDDP:Day2に投与 ・プレドニゾロンをDay1～5に内服 ・上記終了後3週間休薬	B Day2～5 □ 4 : ダカルバジン(250mg/m ²) □ 2 : プリンペラン(10mg/A) □ 3 : プリンペラン(10mg/A)	mg 1A 1A	生食 ソリタT3号 ソリタT3号	500mL 500mL 500mL	2時間DIV 2.5時間DIV 2.5時間DIV	
DG療法 (DOC/GEM) 【1クール】21日 ・DOC:Day8に投与 ・GEM:Day1に投与 ・デカドロン錠:day8～10に内服 ・アルコール過敏の確認！！ ・上記終了後1週間休薬	A Day1 □ 1 : 生食(20mL/hr) □ 2 : デカドロン(1.65mg/A) □ 3 : ネオレスター(10mg/A) □ 3 : ゲムシタビン(800mg/m ²) □ 4 : プッシュ用生食 ★ Day8、デカドロン錠 4mg/body を夕に内服 ★ Day9～10、デカドロン錠 4mg/body を朝・夕に各内服	100mL 4A 1A mg 50mL	グラニセトロン点滴静注3mg/バック 生食	1P 100mL	末梢keep 30分DIV iv 30分DIV -	

がん化学療法レジメン一覧(平滑筋肉腫)

レジメン名	プロトコール					
DG療法 (DOC/GEM) 【1クール】21日 ・DOC:Day8に投与 ・GEM:Day1に投与 ・デカドロン錠:day8～10に内服 ・アルコール過敏の確認！！ ・上記終了後1週間休薬	B Day8					
	<input type="checkbox"/> 1 : 生食(20mL/hr) 100mL <input type="checkbox"/> 2 : デカドロン(1.65mg/A) 4A <input type="checkbox"/> 3 : ネオレスター(10mg/A) 1A <input type="checkbox"/> 4 : ゲムシタビン(800mg/m ²) mg <input type="checkbox"/> 5 : ドセタキセル(60～70mg/m ²) mg <input type="checkbox"/> 6 : プッシュ用生食 50mL 50mL		グラニセトロン点滴静注3mg/バック 生食 5%ブドウ糖	1P 100mL 250mL	末梢keep 30分DIV iv - 1時間DIV iv	