

【食道がん】

レジメン名	プロトコール				
TXL療法 (TXL) 【1クール】49日 ・TXL:Day1、8、15、22、29、36に投与 ・上記終了後1週間休薬	A Day1,8,15,22,29,36 □ 1 ヘパリンNaロック100シリンジ □ 2 :デカドロン(1.65mg/A) □ 3 :ネオレスター(10mg/A) □ 4 :ファモチジン(20mg/A) □ 5 :パクリタキセル「NK」(90mg/m ²) □ 6 プッシュ用生食 □ 7 ヘパリンNaロック100シリンジ	5mL 4A 1A 20mg mg 50mL	グラニセトロン点滴静注3mgバック「HK」 生食 生食	1P 20mL 200mL	— 30分DIV iv iv 2時間DIV — —
FP療法 (CDDP/5-FU) 【1クール】28日 ・CDDP:Day1に投与 ・5-FU:Day2、3、4に投与 ・上記終了後3週間休薬	☆ 前日ソルデム3A 2000mLの負荷 A Day1 □ 1 ラクテック □ 2 :デカドロン(1.65mg/A) □ 3 :ラシックス(20mg/A) □ 4 :シスプラチン(70mg/m ²) □ 5 ラクテック ☆ 6 以降ソルデム3A 80mL/hr	1000mL 4A 20mg mg 1000mL	グラニセトロン点滴静注3mgバック「HK」 生食	1P 1000mL	— 250mL/hr 30分DIV IV 2時間DIV 250mL/hr
FP療法 (CDDP/5-FU) 【1クール】28日 ・CDDP:Day1に投与 ・5-FU:Day2、3、4に投与 ・上記終了後3週間休薬	B Day2~4 □ 1 :フルオロウラシル (800mg/m ²) □ 2 プッシュ用生食	mg 50mL	ソルデム3A	500mL	20mL/hr

レジメン名	プロトコール				
ドセタキセル療法 (DOC) 【1クール】21日 ・DOC:Day1に投与 ・アルコール過敏の確認！！ ・上記終了後2週間休薬	A Day1 <input type="checkbox"/> 1 ヘンリシンNaロック100シリンジ <input type="checkbox"/> 2 : デカドロン(1.65mg/A) <input type="checkbox"/> 3 : ドセタキセル(70mg/m ²) <input type="checkbox"/> 4 プッシュ用生食 <input type="checkbox"/> 5 ヘンリシンNaロック100シリンジ	5mL 4A mg 50mL 5mL	グラニセトロン点滴静注3mgバック「HK」 生食	1P 250mL	— 30分DIV 1時間DIV — —